DETERMINACIÓN	Alfa - fetoproteína (AFP)
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	17/01/2014
SERVICIO	Análisis Clínicos
MÉTODO ANALÍTICO	Ensayo secuencial inmunométrico quimioluminiscente en fase sólida
MUESTRA/ESPECIMEN	Suero
INDICACIONES	Seguimiento de pacientes con carcinoma hepatocelular, cáncer testicular no seminomatoso, tumores germinales de ovario y cáncer gástrico.
CONDICIONES PACIENTE/MUESTRA	Ninguna especial. No es necesario ayuno. Liquido obtenido por punción local y aspirado. Centrifugar para separar el componente celular. Estable 3 días a 8ºC *
INSTRUMENTACIÓN	Siemens. Immulite 2000.
MATERIALES Y REACTIVOS	Reactivos dedicados Siemens Ref. LK2AP6. Calibrador WHO 1º IS 72/225.
PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE TRABAJO	
TIEMPO DE EMISIÓN DE INFORMES	36 horas laborales.
VALORES DE REFERENCIA	1 -7 ng/ ml
INTERPRETACIÓN	Falsos positivos leves: enfermedades autoinmunes Falsos positivos moderados: hepatobiliares Falsos positivos importantes: embarazo, tirosinemia hereditaria, ataxia telangectasia
INDICADORES DE ACTIVIDAD	8674 test en el año 2012. Aprox. 700 determinaciones/mes
INDICADORES DE CALIDAD	Año 2013. Error total 7.53% (objetivo < 21.90). Error sistemático -0.63%. Coeficiente de variación 4.18%. Fuente: Unity Real Time. Nivel 83.28 ng/ml Liquichek Tumor Marquer.
COSTES ECONÓMICOS	Coste por determinación aprox. 1.68 € (2013)
OBSERVACIONES	