

## TRATAMIENTO CON INSULINAS SUBCUTÁNEAS

Si usted está en tratamiento con insulina, lleve consigo sus propias plumas de insulina.

La NOCHE PREVIA a la operación **REDUCIRÁ la dosis de insulina Lenta** (*Glargina, Detemir, Degludec*) en un 20 % si se administra en horario nocturno (cena, al acostarse).

**\*REDUCIRÁ la dosis de Insulina Lenta** (*Glargina, Detemir, Degludec*) a la mitad (**en un 50%**), si ésta se administra en horario **matutino (mañana o mediodía)**.

**\* REDUCIRÁ la dosis de Insulina Intermedia (NPH) o Premezcladas** a la mitad (**en un 50%**), si ésta se administra en horario **matutino (mañana o mediodía)**.

**\* Se medirá la glucemia** (capilar-pinchazo o sensor) antes de salir de casa. Comunique el resultado a la enfermera del hospital de día quirúrgico.

**\*\* Tras la operación vaya reintroduciendo las insulinas según la ingesta hasta alcanzar su situación basal.**

Si usted es portador del sensor del sistema flash de monitorización de glucosa en tiempo real (FreeStyle Libre®), no existe inconveniente para que mantenga dicho sensor durante todo el periodo de antes, durante y después de la intervención. Traiga al hospital el lector específico del sensor para facilitar la monitorización de la glucemia en tiempo real durante todo el proceso.

## TRATAMIENTOS CON BOMBA DE INSULINA

Si usted está en tratamiento con bomba de insulina puede mantener la bomba de insulina antes, durante y después de la operación, sólo si su médico anestesista así se lo ha comunicado.

Traerá recambios de fungibles y sus propias plumas de insulina al hospital.

El día de la operación, como estará en ayunas, **no se administre bolos de insulinas prandiales** (los bolos de rápida que se pone con las comidas, dado que está en ayunas).

El día de la operación, como estará en ayunas, haga lo siguiente:

**\*Activará un "PERFIL BASAL TEMPORAL o un PERFIL BASAL ALTERNATIVO", de un 50% de la dosis habitual (es decir, una reducción del 50% de su patrón basal).**

**\*Se medirá la glucemia** (capilar-pinchazo o sensor) antes de salir de casa y sólo se administrará un bolo corrector de insulina si la glucemia es **mayor de 180mg/dl**.

**\*\* Tras la operación volverá a su patrón de insulina habitual según la ingesta.**

Unidad Hospital de Día Quirúrgico

**Teléfono 65080**

Hospital Universitario "Marqués de Valdecilla"

Avda. de Valdecilla, s/n

Santander C.P. 39008

Junio 2023



## INFORMACIÓN PACIENTE DIABÉTICO PARA CIRUGÍA AMBULATORIA

### SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN SERVICIO ENDOCRINOLOGÍA



**POR FAVOR LEA ESTA INFORMACIÓN,**

**LE SERÁ ÚTIL**



La diabetes mellitus, en sus diferentes formas, tanto la de tipo 1 (de aparición generalmente en la infancia y con necesidad de tratamiento con insulina), como la tipo 2 (que puede tratarse con pastillas al menos al inicio) es una enfermedad cada vez más frecuente en el mundo occidental.

La cirugía es habitual en el paciente diabético y puede ocasionar descompensación de la glucemia. Para evitarlo es importante que siga estas recomendaciones.

Tenga en cuenta que el día de la intervención tendrá que venir en ayunas, por lo que es importante evitar tanto que el azúcar en sangre (glucemia) suba como que baje demasiado.

El tratamiento de la diabetes puede realizarse mediante pastillas y/o mediante las inyecciones de insulina.

## TRATAMIENTO CON ANTIDIABÉTICOS ORALES (PASTILLAS)

Si usted toma alguna de estas pastillas siga las recomendaciones de tiempo de suspensión antes de la cirugía según la siguiente tabla:

Nombre comercial (principio activo)	SUSPENSIÓN ANTES DE LA OPERACIÓN
<b>Invokana</b> ® (canagliflozina) <b>Edistride</b> ® (dapagliflozina) <b>Forxiga</b> ® (dapagliflozina) <b>Jardiance</b> ® (empagliflozina) <b>Steglatro</b> ® (ertugliflozina)	2 DÍAS antes de la operación
<b>Dianben</b> ® (metformina) <b>Ubene</b> ® (metformina) <b>Metformina</b> ® (metformina)	1-2 DÍAS antes de la operación(*)
<b>Daonil</b> ® (glibenclamida) <b>Glucolon</b> ® (glibenclamida) <b>Diamicron</b> ® (gliclazida) <b>Amaryl</b> ® (glimepirida) <b>Roname</b> ® (glimepirida) <b>Minodiab</b> ® (glipizida) <b>Staticum</b> ® (glisentida)	1 DÍA antes de la operación
<b>Actos</b> ® (pioglitazona)	No tomar la mañana del día de la operación
<b>Starlix</b> ® (nateglinida) <b>NovoNorm</b> ® (repaglinida) <b>Prandin</b> ® (repaglinida)	No tomar la mañana del día de la operación
<b>Glucobay</b> ® (acarbosea)	No tomar la mañana del día de la operación
<b>Vipidia</b> ® (alogliptina) <b>Trajenta</b> ® (linagliptina) <b>Onglyza</b> ® (saxagliptina) <b>Sitagliptina</b> ® (sitagliptina) <b>Januvia</b> ® (sitagliptina) <b>Ristaben</b> ® (sitagliptina) <b>Tesavel</b> ® (sitagliptina) <b>Xelevia</b> ® (sitagliptina) <b>Vildagliptina</b> ® (vildagliptina) <b>Galvus</b> ® (vildagliptina) <b>Jalra</b> ® (vildagliptina) <b>Xilliarx</b> ® (vildagliptina)	No tomar la mañana del día de la operación

\* Según le indique el anestesista

## TRATAMIENTO CON ANTIDIABÉTICOS SUBCUTÁNEOS (JERINGA)

Nombre comercial (principio activo)	SUSPENSIÓN ANTES DE LA OPERACIÓN
<b>Trulicity</b> ® (dulaglutida) <b>Bydureon</b> ® (exenatida) <b>Ozempic</b> ® (semaglutida)	No inyectar la <b>semana anterior</b> a la operación
<b>Victoza</b> ® (liraglutida) <b>Byetta</b> ® (exenatida) <b>Lyxumia</b> ® (lixisenatida)	No inyectar la <b>mañana del día</b> de la operación

## COMBINACIONES DE VARIOS FÁRMACOS

<b>Vipdomet</b> ® <b>Incesync</b> ® <b>Jentaducto</b> ® <b>Komboglyze</b> ® <b>Efficib</b> ® <b>Janumet</b> ® <b>Ristfor</b> ® <b>Velmetia</b> ® <b>Eucreas</b> ® <b>Icandra</b> ® <b>Zomarist</b> ®	<b>Vokanamet</b> ® <b>Xigduo</b> ® <b>Synjardy</b> ® <b>Segluromet</b> ® <b>Glyxambi</b> ®	<b>Tandemact</b> ® <b>Competact</b> ® <b>Glubrava</b> ®
Suspender 1 DÍA antes de la operación	Suspender 2 DÍAS antes de la operación	Suspender 1 DÍA antes de la operación

\* **Se medirá la glucemia** (capilar-pinchazo o sensor) antes de salir de casa. Dé el resultado a la enfermera del hospital de día quirúrgico.

\* Tras la operación, si no hay inconveniente para realizar una dieta normal, reanudará el tratamiento con la medicación según la pauta habitual.