

SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

CONSULTAS EXTERNAS

ADMINISTRACION DE PENTAMIDINA

¿Qué es la pentamidina y dónde se administra?

La pentamidina es una medicación antiinfecciosa que se administra de forma inhalada en el Servicio de Consultas Externas del Servicio de Enfermedades Infecciosas. La Unidad se encuentra en la planta 2 pasillo 2 de Valdecilla Sur. La sala de espera es la Q.

¿Cómo se realiza la administración?

El día previo a la administración de su tratamiento, el personal de la consulta se pondrá en contacto telefónico con usted para confirmar su cita y valorar su estado de salud (en caso de síntomas respiratorios no es aconsejable la administración del tratamiento).

A su llegada a la consulta, deberá permanecer en la sala de espera hasta ser llamado. La enfermera le administrará un broncodilatador prescrito por su médico llamado Terbasmin[®], que facilitará la absorción de la medicación pentamidina y evitará episodios de broncoespasmos. Hará 2 inhalaciones de Terbasmin[®] y se enjuagará la boca con agua para eliminar restos de medicación adheridos a la mucosa bucal.

A continuación, la enfermera le administrará la medicación pentamidina mediante una cámara con una boquilla, a través de la cual realizará inspiraciones y espiraciones hasta el que se termine la medicación. Al finalizar realizará enjuagues bucales de nuevo.

Durante la administración deberá permanecer solo en la consulta y sin acompañante. Dispondrá de un timbre en caso de necesitar la presencia del personal de la consulta.

Al terminar el tratamiento puede irse a su domicilio.

RECOMENDACIONES previas a la administración de la medicación

- No acudir en ayunas pero evitar comidas copiosas.
- No es necesario que traiga el volante con la prescripción.
- En caso de que le prescriban nuevos medicamentos informar a su médico previamente para evitar interacciones.

RECOMENDACIONES tras la administración de la medicación

- Evitar comidas copiosas.
- Evitar consumo de tabaco y bebidas excitantes (caféina, té, bebidas energéticas).

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS (poco frecuentes y transitorios)



Fatiga
Sabor metálico en la boca
Tos
Náuseas
Sensación de ardor en la garganta
Disminución del apetito
Mareo o síncope
Prurito o picazón

OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Acuda siempre con cita programada.
- Se le facilitarán los teléfonos de contacto de la Consulta de Enfermedades Infecciosas para que pueda notificar dudas, retrasos en su cita o imposibilidad de acudir, para lo que tendrá que solicitar una nueva cita.

Consulta de Enfermería **942 203344/ 942 315622/ 942 315623**
Citaciones **942 202669/ 942 315543**
Horario de lunes a viernes 8 a 14,30 h

Fuera de este horario en caso de que la atención que precisa sea urgente deberá acudir al Servicio de Urgencias.

POR FAVOR LEA ESTA INFORMACIÓN,

LE SERÁ ÚTIL