


SERVICIO RADIODIAGNÓSTICO Y NEFROLOGÍA

ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTE YODADO

- ✓ Los contrastes yodados se inyectan por vía intravenosa mientras se realiza el estudio radiológico. Permiten que se realcen algunas estructuras internas y en muchas ocasiones son fundamentales para poder llegar a un diagnóstico preciso.
- ✓ Pese a ser considerados muy seguros, es fundamental que usted conozca la siguiente información:
 - El contraste se elimina a través de la orina y es MUY IMPORTANTE cuidar su riñón para no producir ningún daño. **Debe beber abundante líquido** para acudir hidratado. Como norma general, medio litro de líquidos dos horas antes de la prueba y dos litros durante las siguientes 24 horas. En algún caso, algún paciente precisa ingreso para hacer esta hidratación por vía intravenosa.
 - Si tiene alguna **enfermedad en el riñón** o alteración en la función renal, comuníquenoslo. El día de la prueba **debe suspender los fármacos tipo diuréticos** (si padece insuficiencia cardíaca o si está tomando diuréticos a dosis elevadas consulte a su médico de cabecera antes de suspenderlos).
 - Si es diabético y está tomando **"pastillas para el azúcar" con metformina deberá suspenderlas** 24 horas antes de realizarse la prueba y reanudarlo 48 horas después de habérsela realizado. Durante esos días deberá extremar los cuidados de su diabetes. Acuda a su médico de cabecera para que le ajuste el tratamiento antidiabético.
 - Debe **suspender** desde el día antes de la prueba y hasta 3 días después todo tipo de fármacos llamados **antinflamatorios no esteroideos** (ibuprofeno, naproxeno, ácido acetil salicílico, desketoprofeno, etc...) generalmente utilizados para tratar el dolor y la inflamación, **o antibióticos del tipo aminoglucósidos**, que normalmente se dan para tratar infecciones graves (gentamicina, tobramicina, amikacina, estreptomina...). Consulte a su médico si tiene dudas.
 - Deberá informar a nuestro personal si padece algún tipo de **alergia**, y muy especialmente si tiene alergia conocida o ha tenido alguna reacción previa al realizarle una exploración con contraste yodado.
- ✓ Sólo 1 a 5 de cada 100 pacientes puede presentar **reacciones** leves, como náuseas, vómitos, urticaria o sensación de calor, reacciones que desaparecen rápidamente. Se estima que una persona cada mil puede presentar una reacción más seria, como dificultad respiratoria, arritmia cardíaca, una baja en la tensión arterial, convulsiones, reacciones que pueden ser fácilmente controladas con medicamentos que están disponibles en la sala en que se realiza su procedimiento.



POR FAVOR LEA ESTA INFORMACIÓN, LE SERÁ ÚTIL

Autor pictogramas: Sergio Palao. Origen: arasaac (<http://www.arasaac.org>). Licencia: cc (by-nc-sa). Propiedad: gobierno de Aragón (España)